



Handvest bij de toepassing van de producten uit de Home and Garden Serie

Algemene werkwijze bij de producten van Pireco :

Capsules: Gaatjes maken in de grond (zie dosering) met de achterkant van een steel, ongeveer 15 cm diep, daar waar het wortelgestel zit. De capsule onderin het gaatje stoppen. Met een gieter water ieder gaatje vullen en vervolgens alle gaatjes weer dicht maken.

Spuiten: In een rugspuit of plantenspuit het geconcentreerde middel oplossen in water zoals de dosering aangeeft. Bovenzijde en onderzijde van de bladeren van de planten druipnat spuiten. Voor een optimale werking van de vloeibare vorm zijn droge omstandigheden een vereiste, zodat bladopname kan plaatsvinden. Belangrijk is bewolkt en bedekt weer. Niet spuiten boven 25 °C.

Verschil tussen aangieten of bodembehandeling: Bodembehandeling bij grotere bomen of struiken die diep bewortelen en/of als deze in verharding staan. Aangieten bij planten die niet zo diep bewortelen en die dichter op elkaar staan zoals bijvoorbeeld vaste planten, kleine heesters en groenten en bloemen.

Aangieten: In een gieter het geconcentreerde middel oplossen in water zoals de dosering aangeeft. De grond vooraf nat maken. Het gehele worteloppervlak van de plant begieten.

Bodembehandeling Vloeibaar (meestal Bodeminsect (SBI) of Bladziekten (MRB) . Vaak in combinatie met bespuiten van blad met Pireco Bladinsect of Pireco Bladziekten, afhankelijk van de aantasting. : De vloeistof oplossen in water volgens de dosering en toedienen in de grond bij de haarwortels van de plant, struik of boom. Maak gaatjes, bijvoorbeeld met een steel, van ca. 15 cm. diep (10 stuks per m2 worteloppervlak). Giet de gaatjes vol met de oplossing en maak de gaatjes weer dicht. Hierna inregenen met ruim water (10 mm.).

Korrels: Bij voorkeur vóór het inzaaien door de bovenste laag (tot 10 à 15 cm diep) van de bodem mengen. Bij bestaande beplanting de korrels door de bovenlaag van de grond mengen en goed inharken. Bij oppotten: de korrels door de gehele potgrond mengen. Daarna heel goed beregenen tenzij anders vermeld wordt. Bij de toepassing van korrels is het belangrijk dat het regenachtig weer is.

Bij zware overlast van insecten of plagen de dosering verhogen en de interval tussen de behandelingen korter houden.

Kamerplanten niet *binnen* behandelen vanwege de extractgeur gedurende het toepassen. De extractgeur verdwijnt overigens na meestal een halve dag.

Bewaren: Alle producten vorstvrij en op een koele en donkere plaats bewaren. Niet in zonlicht bewaren.



Het weren van insecten en larven in en rondom planten :

Aaltjes: Pireco® Schadelijke Aaltjes (SBA)

- **Aaltjes op groenten:** zoals aardappelcysteaaaltje, wortelknobbelaaltje , bietencysteaaaltje. Preventief vóór het inzaaien de korrels door de grond mengen en anders bij bestaande beplanting korrels door de bovenlaag van de grond mengen. Goed beregenen. Daarna na 2 weken met Pireco® SBA Vloeibaar d.m.v. aangieten. Het aangieten een aantal keren herhalen om de 2 à 4 weken , afhankelijk van de druk en soort aaltjes en soort groente.
- **Rozenaaltjes:** (rozenmoehheid): Preventief bij voorkeur de korrels vóór het inplanten door de bovenlaag van de grond mengen en anders de korrels door de bovenlaag van het bestaande perk mengen. Goed beregenen. Daarna na 2 weken met Pireco® SBA Vloeibaar aangieten. Deze behandeling na 2 à 4 weken herhalen.

Aardbeibloesemkever: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Na signalering van de eerste kevers of gestoken bloemknoppen spuiten bij droog weer. Deze behandeling na 2 à 4 weken herhalen tot de aantasting verdwenen is.

Aardrupsen: Pireco® Bodeminsecten (SBI). Preventief vóór het inzaaien de korrels door de grond mengen en anders bij bestaande beplanting korrels door de bovenlaag van de grond mengen. Goed beregenen. Behandeling kan afhankelijk van soort groente verschillen.

Aardvlooien: Pireco® Bodeminsecten (SBI) Vloeibaar aangieten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.

Appelbladvlo: Pireco® Bladinsecten (LWS)Vloeibaar. Preventief spuiten bij droog weer. Deze behandeling na 4 weken herhalen.

Bladmineerder op fruit : Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Behandeling : eerst aangieten en na 2 weken spuiten bij droog weer. De bladeren goed raken aan zowel bovenzijde als onderzijde.

Bladroller

- **op rozen** : Pireco® Bladinsecten (LWS) capsules (preventief beginnen) en bij droog weer Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar spuiten. Deze behandeling bij droog weer na 4 weken herhalen gedurende de periode dat men bladrollers kan verwachten.
- **op fruit** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Aangieten en na 2 weken bij droog weer spuiten. Deze behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen.

Buxus bladvlo Pireco® Bladinsecten (LWS). Preventief capsules bij solitaire planten. Aangetaste planten spuiten bij droog weer. Deze behandeling na 2 à 4 weken bij droog weer herhalen. Bij aantastingen in hagen eerst het hele worteloppervlak aangieten en daarna de bladeren bespuiten. Ook weer herhalen.

Cicades:

- **op fuchsia:** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer spuiten. Deze behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen.
- **Op rozen:** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer spuiten. Deze behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen.
- **Schuimcicade:** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer spuiten. Deze behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen.

Coloradokever: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Het blad bij droog weer spuiten .

Eizenhaantje Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer spuiten. Deze behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen.

Engerlingen in gras : zie grasinsecten

Engerlingen in siertuin of moestuin : Pireco® Schadelijke Bodeminsecten (SBI) . Preventief korrels door de bovenlaag van de grond mengen. Bij aantasting behandelen met Pireco® Schadelijke Bodeminsecten (SBI) d.m.v. aangieten .

Emelten in gras : zie grasinsecten

Emelten in siertuin of moestuin : Pireco® Schadelijke Bodeminsecten (SBI) . Preventief korrels door de bovenlaag van de grond mengen. Bij aantasting behandelen met Pireco® Schadelijke Bodeminsecten (SBI) d.m.v. aangieten .

Galmijt (schadelijke vorm) op o.a. druiven : Pireco® Bladinsecten (LWS) capsule en nabehandeling d.m.v. Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer spuiten .

Galmug : Bladgalmug (o.a. Hemerocalissen) : Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar aangieten. Behandeling na 4 weken herhalen.

Grasinsecten en -larven :

- **Engerling, Emelt en Rouwvlieg** : Pireco® Grasinsecten korrels bij voorkeur preventief door de grond mengen vóór het inzaaien en anders bij bestaand gras de korrel preventief strooien. Nadien na 2 à 4 weken het gras bespuiten met Pireco® Grasinsecten Vloeibaar. Bij ernstige schade de vloeibare behandeling herhalen om de 4 weken. Altijd na iedere behandeling het gras flink beregenen. Afhankelijk van het soort kever (en dus larve) en temperatuur kan het zijn dat de behandelperiode loopt vanaf maart tot en met oktober. De behandeling zonodig in het voorjaar herhalen, in verband met sommige larve-soorten die in de winter overleven en dan weer naar boven komen. De conditie van het gras verbeteren met Omnifertil Vloeibaar en/of Omnigreen korrels (droge zandgrond).
 - **vanaf eind april / begin mei**: korrels strooien. Flink beregenen. Na 4 weken de grasmat bespuiten met Grasinsecten Vloeibaar en beregenen. Bespuiting na 4 weken herhalen.
 - **Juli / Augustus** : korrels strooien. Flink beregenen. Na 4 weken de grasmat bespuiten met Grasinsecten Vloeibaar en beregenen. Bespuiting na 4 weken herhalen.
 - **September / November** : korrels strooien. Flink beregenen. Na 4 weken de grasmat bespuiten met Grasinsecten Vloeibaar en beregenen. Bespuiting na 4 weken herhalen.
- **Wortelknobbelaaltjes in gras**: Pireco® Schadelijke Aaltjes (SBA) korrels strooien. Goed beregenen. Na 2 weken aangieten met Pireco® Schadelijke Aaltjes (SBA) Vloeibaar. Het aangieten na 4 weken herhalen.

Hazelnootboorder Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Preventief de hazelnootboom vanaf mei bij droog weer helemaal bespuiten . Deze behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen. Vanaf het moment dat de hazelnoten vallen een bodembehandeling doen d.m.v. aangieten. Deze behandeling om de 4 weken herhalen.

Kastanjabloedingsziekte: Zelf behandelen is mogelijk maar vrij intensief werk. Bij voorkeur te behandelen door ervaren boombehandelaars. Neem alstublieft contact met ons op.

Kevers: behandeling is afhankelijk van de soort kever (en larve van de kever)

- **Bloesemkevers**: Pireco Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Het blad bij droog weer spuiten. Na 2 weken herhalen tot de aantasting voorbij is.
- **Meikevers, Junikevers, Rozenkever etc.** : zie Grasinsecten
- **Taxuskevers** (lapsnuitkever): Bij geconstateerde aantasting Pireco® Bodeminsecten korrel (SBI) door het gehele worteloppervlak mengen om de larven te weren. Goed beregenen. Na 2 weken met SBI Vloeibaar aangieten.

Daarna, afhankelijk van het seizoen, in ieder geval vanaf het voorjaar, om de 4 weken de planten bespuiten Pireco Bladinsect om de kever te weren. In de lente, zodra de eitjes gelegd zijn weer om de 4 weken de bodem aangieten en de bespuitingen herhalen om de larven die uit de eitjes komen af te weren.

Bij hagen en klimplanten: met Pireco® Bodeminsecten korrel (SBI) de bodem aangieten en met Pireco Bladinsecten (LWS) Vloeibaar het blad bespuiten van de gehele haag /klimplant en/ of muur en eventueel borders rondom, 1 liter concentraat in oplossing van 50 liter water per 500 m2 haagblad (voor en achterkant) . De haag van binnen en van buiten bespuiten.

Vervolgbehandelingen en preventief gericht: iedere vier weken, te beginnen in maart tot en met oktober, met Pireco® Bodeminsecten (SBI) Vloeibaar bij droog weer aangieten en zo nodig ook bespuiten (hagen en klimplanten) met Pireco Bladinsecten (LWS) Vloeibaar . Bij potplanten de potten eerst goed schoonmaken en de korrels bij het oppotten door de grond mengen conform dosering , goed beregenen en na 4 weken de planten nogmaals aangieten en zonodig bespuiten.
- **Maiswortelkever** : Pireco® Bodeminsecten korrels. Goed beregenen. Na 2 weken met SBI Vloeibaar aangieten. Het aangieten na 4 weken herhalen.
- **Schorskevers en Stamboorders**: Pireco Bodeminsecten (SBI) Vloeibaar, toepassen als stambespuiting. De schors van de boom bij droog weer druipnat spuiten . Drie keer per seizoen toepassen. Bij ernstige aantastingen contact met Pireco opnemen.
- **Prachtkevers: Perenprachtkever (perenringworm)** : Zodra de boom begint uit te lopen **met** Pireco® Bodeminsect (SBI) Vloeibaar het gehele worteloppervlak aangieten. Bij aangetaste bomen vervolgens de gehele boom druipnat spuiten met Pireco Bladinsecten (LWS) Vloeibaar, vooral de houtige

gedeelten waar de eitjes zitten. Ook het blad van onderen en boven goed nat spuiten. Na 4 weken de behandeling herhalen. Eventueel tegelijkertijd de stam behandelen met Pireco pasta.

- **Spintkever** : Zie behandeling Prachtkevers .

Koolmot: zie Rupsen en behandeling bladruksen

Koolgalmug Pireco® Bodeminsecten. Preventief vóór het inzaaien de korrels door de grond mengen en anders bij bestaande beplanting korrels door de bovenlaag van de grond mengen. Goed beregenen. Nabehandeling i.v.m. volgende generaties : Pireco® Bodeminsecten Vloeibaar aantal keren herhalen tot dat ook de eitjes verdwenen zijn d.m.v. aangieten en bespuiten bij droog weer, vooral in de hartbladeren, afhankelijk van soort groente .

Leliehaantje Pireco® Bladinsecten LWS Capsules in de grond. Vervolgens bijtijds Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar aantal keren herhalen d.m.v. spuiten bij droog weer.

Luizen in planten :

- **Bladluis op groente** : Pireco® Bladinsecten (LWS). Behandeling : preventief capsules in de grond stoppen en bij aantasting de bladeren bij droog weer bespuiten met Pireco® LWS Vloeibaar ; na 4 weken herhalen tot de aantasting verdwenen is.
- **Bladluizen op sierplanten**: Pireco® Bladinsecten (LWS) capsules (preventief beginnen en bij aantasting de bladeren bespuiten bij droog weer met Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar ; na 4 weken herhalen tot de aantasting verdwenen is.
- **Bladluizen op rozen**: Pireco® Bladinsecten (LWS) capsules (preventief beginnen en bij aantasting de bladeren bij droog weer bespuiten met Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar ; na 2 à 4 weken herhalen tot de aantasting verdwenen is.
- **Bladluizen op coniferen**: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Indien er voorgaande jaren een aantasting is geweest dan preventief aangieten in het voorjaar. Bij een aantasting de conifeer bij droog weer van buiten en van binnen in de haag met een veldspuit drijfmat spuiten en de bodem aangieten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Sparrenluis**: Pireco® Bladinsecten (LWS) (LWS) Vloeibaar. Indien er voorgaande jaren een aantasting is geweest dan preventief aangieten in het voorjaar. Bij een aantasting de spar bij droog weer van buiten en van binnen in de haag met een veldspuit drijfmat spuiten en de bodem aangieten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Bladluizen op fruit**: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar . Behandeling : Vloeibaar preventief spuiten bij droog weer. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Bessenbloedblaarluis**: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer preventief spuiten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Beukenbladluis**: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar (LWS) Vloeibaar. Indien er voorgaande jaren een aantasting is geweest dan preventief aangieten in het voorjaar. Bij een aantasting de beuk bij droog weer van buiten en van binnen in de haag met een veldspuit drijfmat spuiten en de bodem aangieten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Rozenluizen**: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer spuiten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Wollige dopluis** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer preventief, onder en bovenzijde blad heel goed raken. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Wolluis** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar bij droog weer preventief de gehele plant bespuiten. Takken en stam goed nat maken. Deze behandeling na 4 weken herhalen.

Mieren : Omniclear (buitenshuis, alleen in op bestrating, niet in planten). Op de plekken waar de mieren uit de bestrating komen de bestrating bespuiten met een rugspuit bij droog en vooral zonnig weer.

Miljoenpoot: voor de behandeling zie Rouwvlieg

Mineervlieg /mineermot:

- **op fruit** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Aangieten en vervolgbehandeling 4 weken later d.m.v. spuiten bij droog weer.
- **op sierplanten**: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. . Aangieten en vervolgbehandeling 4 weken later d.m.v. spuiten bij droog weer.
- **op bomen (kastanjemineermot)** : preventief aangieten met Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar van de gehele wortelzone. Bij een aantasting van grote bomen de boom professioneel laten behandelen, neem dan contact met ons op. Een preventieve behandeling heeft zeker zin.

Mijten in planten:

- **Topmijt / Buxustopmijt:** Pireco® Bladinsecten (LWS) Preventief capsules bij solitaire planten. Aangetaste planten spuiten bij droog weer. Deze behandeling na 2 à 4 weken bij droog weer herhalen. Bij aantastingen in hagen eerst het hele worteloppervlak aangieten en daarna de bladeren bespuiten. Ook weer herhalen.

Perenbladvlo: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar preventief spuiten bij droog weer. De spuitbehandeling na 4 weken herhalen bij droog weer.

Preimot: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Het blad bespuiten bij droog weer. De spuitbehandeling na 4 weken herhalen bij droog weer.

Ritnaalden: Pireco® Bodeminsect (SBI) korrel preventief en na 2 weken aangieten. Het aangieten na 4 weken herhalen tot de ritnaalden verdwenen zijn.

Rouwvlieg: bij groenten (kruidachtige planten) Pireco® Bodeminsecten (SBI) korrels. Goed beregenen. Daarna na 2 weken aangieten met SBI Vloeibaar. Het aangieten na 4 weken herhalen tot de rouwvliegen en de eitjes verdwenen zijn.

Rupsen algemeen : De behandeling is afhankelijk van het soort rups en de plaats van de rups. Onder te verdelen in 2 categorieën:

- **Bladrupsen:** Behandelen met Pireco® Bladinsecten (LWS). Preventief capsules door de grond mengen en bij aantasting de bladeren van boven en van onderen bij droog weer bespuiten met Bladinsecten LWS Vloeibaar ; na 4 weken herhalen tot de aantasting verdwenen is.
- **Bodemrupsen:** Behandelen met Pireco® Bodeminsecten (SBI). Preventief vóór inzaai korrels door de grond mengen. Goed beregenen. Daarna aangieten met SBI Vloeibaar. Vervolgens het aangieten een aantal keren herhalen , afhankelijk van soort groente
- **Ringelrups / spanrups :** behandelen als een Processierups.
- **Koolwitje, Koolmot** behandelen als een Bladrups
- **Nachtvlinder** behandelen als een bodemrups
- **Bastaardsatijnrups- satijnvlinder :** behandelen als een Bladrups
- **Spinselmot / stippelmot** behandelen als een Bladrups
- **Processierups:** preventief te behandelen vanaf begin april. Bij voorkeur door professionele boombehandelaars vanwege de intensieve behandeling . Bij een nieuwe aantasting eveneens te behandelen maar dan uitsluitend door ervaren boombehandelaars in verband met het gevaar van de brandharen op de gezondheid van mensen. Neem alstublieft hierover contact met ons op.

Schildluizen :

- **Kommaschildluizen** Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar spuiten bij droog weer. De spuitbehandeling na 4 weken herhalen bij droog weer.

Spint :

- **Coniferenspint:** Pireco® Bladinsecten (LWS) : Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Indien er voorgaande jaren een aantasting is geweest dan preventief aangieten in het voorjaar. Bij een aantasting de conifeer bij droog weer van buiten en van binnen in de haag met een veldspuit drijfmat spuiten en de bodem aangieten. Deze behandeling na 4 weken herhalen.
- **Spint op fruit** en sierplanten: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar spuiten bij droog weer. De spuitbehandeling na 4 weken herhalen bij droog weer.

Trips: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar, Behandeling : Vloeibaar spuiten bij droog weer. Aantal keren herhalen , afhankelijk van soort groente. Capsules preventief inbrengen in de grond heeft geen zin.

Varenrouwmug : Pireco® Bodeminsecten (SBI) , korrels. Goed beregenen. Daarna aangieten met SBI Vloeibaar. Het aangieten na 4 weken herhalen tot de Varenrouwmug en nakomelingen verdwenen zijn.

Wants op fruit: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Spuiten bij droog weer. De spuitbehandeling na 4 weken herhalen bij droog weer.

Wilgenhaantje: voor de behandeling zie Elzenhaantje

Witte vlieg: Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Preventief Capsules in de grond stoppen. Bij nieuwe aantasting aangieten, in combinatie met spuiten bij droog weer. Bespuitingen om de 2 à 4 weken herhalen , afhankelijk van soort groente of sierplant.

Wortelboorder (o.a. de laboorder) Pireco® Bodeminsecten (SBI). Preventief vóór het inzaaien of inplanten de korrels door de grond mengen en anders bij bestaande beplanting korrels door de grond mengen. Goed beregenen. Nabehandelen d.m.v. aangieten met Pireco® Bodeminsecten (SBI) Vloeibaar. Het aangieten om de 2 weken herhalen , afhankelijk van soort groente

Wortelduizendpoot voor de behandeling zie Rouwvlieg

Zwarte bonenluis Pireco® Bladinsecten (LWS) Vloeibaar. Spuiten bij droog weer. De behandeling na 4 weken bij droog weer herhalen tot de aantasting verdwenen is.

Het afweren van Bladschimmels en Bladvlekken, Bodemschimmels :

Blackspot: Zie behandeling Bladvlekkenziekte

Bladvalziekte Pireco® Bladziekten (MRB). Preventief capsules in de grond stoppen. In het voorjaar spuiten bij droog weer en aangieten om de schimmelsporen van de het voorgaande jaar geen kans te geven . De behandeling herhalen. Na een lange regenperiode de behandeling opnieuw uitvoeren. Bladvalziekte is vaak het gevolg van slechte wortelomstandigheden waardoor de schimmel makkelijker kan toeslaan.

Bladvlekkenziekte: Pireco® Bladziekten (MRB). Preventief capsules in de grond stoppen. Spuiten met MRB Vloeibaar bij droog weer. De bodem aangieten en de grond (dus niet het blad) naberegemen. De behandeling herhalen om de 2 à 4 weken.

Botrytis: Pireco® Bladziekten (MRB) Vloeibaar. Onder droge omstandigheden spuiten.

Grasschimmels:

- **Grasbladschimmels** zoals Fusarium Rooddraad, Dollarspot spuiten met Pireco® Bladziekten (MRB) bij droog weer
- **Grasbodemschimmels** zoals Pythium. Pireco® Bodemschimmel (SBS) Vloeibaar aangieten + naberegemen (bij nat weer)

Fusarium (wortelrot): Pireco® Bodemschimmel (SBS) korrels preventief door de grond mengen + 4 weken later aangieten met Pireco® Bodemschimmel (SBS) Vloeibaar. De behandeling van het aangieten herhalen

Knolvoet: Pireco® Bodemschimmel (SBS) korrels voor inplant en nabehandeling door aangieten.

Krulziekte: Pireco® Bladziekten (MRB). Dit is een blad schimmel dus preventief spuiten en nabehandelen doormiddel van spuiten, bladeren goed raken.

Monilia: of Fruitrot wordt veroorzaakt door het klimaat. Pireco® Bladziekten (MRB). Spuiten bij ontwikkeling van de vrucht, niet te lang doorgaan in verband met smaak.

Mozaiekvirus: wordt vaak overgebracht door insecten. Preventief proberen te voorkomen door het gebruik van Pireco® Bladinsecten LWS

Omvalziekte: kan een vorm van Pythium zijn dus Pireco® Bodemschimmels (SBS) korrel preventief en nabehandelen met aangieten.

Meeldauw:

- **Valse meeldauw** : Voor de behandeling zie Bladvlekkenziekte.
- **Echte meeldauw**: Voor de behandeling zie Bladvlekkenziekte.
- **Meeldauw bij rozen**: Voor de behandeling zie Bladvlekkenziekte.
- **Meeldauw in druiven**: Voor de behandeling zie Bladvlekkenziekte.
- **Meeldauw in fruit**: Voor de behandeling zie Bladvlekkenziekte.
- **Pythium**: (kiemplantenziekte en wortelrot) : Pireco® Bodemschimmel (SBS) korrels preventief door de grond mengen . Beregenen. + 4 weken later aangieten met Pireco® Bodemschimmel (SBS) Vloeibaar. De behandeling van het aangieten herhalen.

Sneeuwschimmel in gras : Pireco® Bodemschimmel (SBS) korrels preventief door de grond mengen + 4 weken later aangieten met Pireco® Bodemschimmel (SBS) Vloeibaar. De behandeling van het aangieten herhalen.

Sterroetdauw op rozen: Pireco® Bladziekten (MRB) Vloeibaar bodembehandeling; eventueel te combineren met capsules .

Roest : zie Bladvlekkenziekte

Verwelkingsziekte(*verticillium*) : Pireco® Bodemschimmels (SBS) aangieten, bij herplant korrels door de grond mengen en goed beregenen.





Klein onkruid, mos en groene aanslag :

Omniclear

Alleen op bestrating, *niet op gras en niet in plantenborders gebruiken.*

Meststoffen : Omnifertil; universeel en organisch met micronutriënten

Bodemstructuurverbeteraars op basis van kleimineralen : Omniterre (puur) en Omnigreen (met mestcoating)

Vijverstructuurverbeteraars op basis van kleimineralen: Omnipond

Mos in gazon: Binnenkort verwacht.

Meer informatie over ziekten en plagen kunt naslaan op de website www.pireco.nl
Informatie over bodemverbetering kunt u naslaan op www.omniproducts.nl

Pireco®

Chroomstraat 8b

8211 AS Lelystad

Nederland

T.: +31 (0) 320 - 23 35 72

F.: +31 (0) 320 - 28 29 72

E.: info@pireco.nl

W.: www.pireco.nl

In samenwerking met

OmniProducts:

www.omniproducts.nl